

arquée jusqu'au bord postérieur de l'œil), la carène du vertex ♀ située plus en avant et un peu plus longue.

Ouganda : mont Loroghi.

MISSION GÉODÉSIQUE DE L'ÉQUATEUR.
COLLECTIONS RECUEILLIES PAR LE D^r P. RIVET.

Coléoptères : Malacodermes proprement dits,

PAR M. J. BOURGEOIS.

Calopteron mesoxanthum nov. sp.

♂. *Oblongo-ovatum, antice sat valde angustatum, subplanatum, brevissime pubescens, vix nitidum, nigrum, elytris violaceo-nigris, fascia mediana, transversa, lata, flavo-aurantiaca ornatis; prothorace latitudine basali fere æquilongo, apicem versus vix angustato, antice subrotundato, lateraliter sat anguste reflexo-marginato, medio longitudinaliter carinato, ad marginem anticum et lateralem rugoso-punctato, angulis anticis rotundatis, posticis sat valde extrorsum productis, subacutis; elytris a basi usque ad trientem posteriorem subrecte dilatatis, dein apicem versus arcuatim attenuatis, 4-costatis, costa secunda paulo fortiori, tertia ad apicem abbreviata, quarta ad humerum subelevata, intervallis costarum clathris transversis in areolas subquadratas divisis, his subplanatis, quinto intervallo costulam intermediam haud præbente; abdominis segmentis ventralibus 8 conspicuis, penultimo postice vix emarginato, ultimo triangulari, bivalvato. — Long., 9 millim.; lat. hum., 2 millim.; lat. max., 4,5 millim. — ♀. *Hucusque invisæ.**

Loja. 1 ♂.

Cette petite espèce est voisine du *C. Bourgeoisii* Kirsch (*Berl. ent. Zeits.*, 1884, p. 48). Elle s'en distingue par la taille sensiblement moindre, par les angles postérieurs du pronotum beaucoup plus saillants, par les élytres moins dilatés et par l'absence d'une costule intermédiaire à l'extrémité du cinquième intervalle.

Plateros collaris nov. sp.

♀. *Parallelus, subplanatus, tenuissime pubescens, nitidiusculus, ochraceus, pronoto utrinque vitta longitudinali nigra elytrorumque regione dorsali fuscescente; capite pone oculos ad latera infuscato, medio longitudinaliter canaliculato anticeque leviter bituberculato; antennis nigris, subcompressis, vix serratis, articulis a 3^o inde latitudine sensim decrescentibus; prothorace*

amplo, subtrapeziformi, basi longitudine latiore, apicem versus parum angustato, antice subangulato-producto, postice utrinque sinuato, lateraliter late marginato sed parum reflexo, angulis anticis bene distinctis, posticis oblique extrorsum sat valde productis, disco inæquali, medio postice subcanaliculato; elytris basi thorace angustioribus, pone humeros vix latioribus, ad apicem singulatim rotundatis, 4-costatis, costis postice evanescentibus, quarta antice elevatiore, ad humerum incrassata, intervallis costarum rugoso-punctatis, tertio costula humiliore longitudinaliter bipartito; corpore subtili nitidiorè, pectore fusco, abdomine pedibusque nigris, trochanteribus femorumque basi rufescentibus; abdominis segmento ultimo subquadrato. — Long., 8 millim.; lat., 2,5 millim. — ♂. Hucusque inivisus.

Santo Domingo de los Colorados, 510 mètres. 1 ♀.

Espèce remarquable par la grandeur de son prothorax et par ses élytres ne présentant que 4 côtes principales et une petite costule intermédiaire dans le milieu du troisième intervalle.

Cantharis convergens nov. sp.⁽¹⁾.

Elongata, apicem versus parum dilatata, opaca, atra, elytris fasciâ lata transversa aurantiaco-fluva pone medium ornatis; capite haud porrecto, nitidiusculo, tenuiter griseo-pubescente, confertissime punctulato; antennis compressis, serratis, basi et apice angustioribus, articulis duobus ultimis flavis, 2° brevissimo, 3° quarto paulo breviorè; prothorace subquadrato, apicem versus parum angustato, latitudine basali paulo breviorè, lateribus fere rectis, nigro-ciliatis, ante medium leviter calloso-incrassatis, angulis anticis subrotundatis, posticis subrectis, extrorsum leviter productis, disco subconvexo, ad latera utrinque longitudinaliter depresso, medio canaliculato; scutello obtriangulari, apice retuso; elytris dense pubescentibus, apicem versus paulum dilatatis, 4-costatis, costis duabus primis bene distinctis, 3 et 4 obsoletis, fere inconspicuis, margine exteriorè a fascia transversa inde usque ad basin anguste flavescente. — Long., 10 millim.; lat. max. elytr., 4,5 millim.

Loja. 1 ♀.

Jolie espèce qui mime le *Calopteron mesoxanthum* décrit ci-dessus.

Cantharis Noireli nov. sp.

Elongata, subparallela, brevissime tomentoso-pubescentis, opaca, atra,

(1) Ce n'est que provisoirement que je range cette espèce et les deux suivantes dans le genre *Cantharis*, dont elles s'éloignent à plusieurs points de vue. Comme faciès, elles participent à la fois des *Daiphron* américains et des *Lycocerus* asiatiques, mais elles n'appartiennent réellement ni à l'un ni à l'autre de ces deux genres. Le matériel trop restreint dont je dispose ne permet pas de leur assigner quant à présent leur véritable place générique.

elytris aurantiaco-flavis, basi præter costam tertiam cuspidatim prolongata; capite haud porrecto, ruguloso; antennis compressis, subserratis, basi et apice angustioribus, articulo 2° brevi, 3° quarto paulo brevioribus; prothorace subquadrato, apicem versus vix angustato, latitudine basali paululo brevioribus, lateribus fere rectis, medio levissime culloso-incrassatis, angulis anticis rotundatis, posticis rectis, subacutis, haud productis, disco subconvexo, utrinque longitudinaliter depresso, medio breviter sulcato; scutello fere semilunato; elytris subparallelis, apicem versus vix dilatatis, dense sericeo-pubescentibus, 3-costatis, costis 1 et 2 bene distinctis, 3^a fere obsoleta; corpore subtus pedibusque fusco-nigris, pectore nitidiusculo. — Long., 11 millim.; lat. max. elytr., 3,5 millim.

Baños, 1,830 mètres, décembre-janvier. 1 ♀ (ma collection).

Cette espèce, que son système de coloration permettra de distinguer facilement, a été capturée par M. le capitaine Noirel, du Service géographique de l'armée, membre de la Mission de l'Équateur. Je me fais un plaisir de la lui dédier.

Cantharis morosa nov. sp.

Elongata, subparallela, opaca, nigra, elytris macula humerali ochracea, elongata, subobliqua ornatis; capite transverso, haud porrecto, convexo, nitidiusculo, pubescente; mandibulis rufis; antennis brevibus, sat crassis, ciliatis, haud compressis vel serratis, apicem versus latitudine sensim decreascentibus, articulis obconicis, 2° tertio dimidio brevioribus, 3° quarto æqualibus; prothorace subquadrato, leviter transverso, antice vix angustato, dense nigro-pubescente, lateribus subrectis, ante medium leviter dentatis, angulis anticis subrotundatis, posticis rectis, haud productis, disco parum convexo, ad latera utrinque et in medio sut late depresso; scutello obtriangulari, apice retuso; elytris tomentosis, subparallelis, costis duabus obliquis singulitim notatis; corpore subtus nigro, pubescente, pectore nitidiusculo. — Long., 6 millim.; lat., 2 millim.

Loja. 1 ♀.

Cette espèce diffère des précédentes, non seulement par la coloration, mais encore par la forme des antennes, qui, au lieu d'être comprimées et subserriformes, sont plus compactes, plus ramassées et composées d'articles obconiques, diminuant graduellement d'épaisseur vers l'extrémité.